

- 2012(42):182-185.
- [33] 许倩倩, 窦迎春, 张燕, 等. 肠道菌群失调患者肛门直肠动力学的研究[J]. 中华临床医师杂志 (电子版), 2017, 11(1): 22-26.
- [34] MULLER-STICH B P, CHOUHRY A, VETTER G. Pre-operative bowel preparation: surgical standard or past? [J]. Dig Surg, 2006, 23(5-6): 375-380.
- [35] 伍颖君. 不同术前肠道准备对结直肠癌术后肠道菌群变化的影响[D]. 广州: 南方医科大学, 2012.
- [36] 蒋蕊. 某院普外科围手术期抗生素应用情况的分析[J]. 中国医药指南, 2014, 12(20): 138-139.
- [37] NAKAMURA T, MITOMI H, LHARA A, et al. Risk factors for wound infection after surgery for colorectal cancer [J]. World Journal of Surgery, 2008, 32(6): 1138-1141.
- [38] 刘海宁, 陈玉琢, 吴昊, 等. 肠道菌群与功能性便秘的研究进展[J]. 复旦学报 (医学版), 2015, 42(4): 564-568.
- [39] 肖宁波. 口服抗生素对术后肠道菌群影响的实验研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2013.
- [40] 梅迪, 刘洋, 胡枋, 等. 探讨术前不同剂量抗生素对结直肠癌根治术患者术后恢复的影响[J]. 中国微生态学杂志, 2016, 27(2): 195-197.
- [41] 杨三龙, 董月新. 预防性应用抗生素后肠道菌群失调及其危险因素分析[J]. 中国实用医药, 2015, 10(56): 149-150.
- [42] KEHLET H, WILMORE D W. Evidence based surgical care and the evolution of fast-track surgery [J]. Ann Surg, 2008(248): 189-198.
- [43] 周大胜, 徐谭文, 陈建华, 等. 加速康复外科对胃肠道恶性肿瘤患者临床结果的影响[J]. 现代肿瘤医学, 2016, 24(10): 1578-1581.
- [44] 简惠仪, 邝焕容, 何丽均. 快速康复外科理念在结直肠癌围手术期中的应用[J]. 中国医学工程, 2017, 25(3): 20-23.
- [45] 冯彩玲, 周佛香. 穴位按摩对胃肠道手术后胃肠功能恢复效果观察[J]. 中医临床研究, 2011, 3(11): 46-47.
- [46] 张双燕, 杜业勤. 温针灸对肠癌术后患者胃肠功能及免疫功能的影响[J]. 中国针灸, 2011, 31(6): 513-517.
- [47] 夏颖, 章茶琴. 足三里联合三阴交艾灸促进腹部术后胃肠功能恢复的观察[J]. 上海针灸杂志, 2014, 33(6): 518-520.
- [48] 凡庆东, 耿协强, 陈辉, 等. 咀嚼口香糖对结直肠癌根治术患者术后肠动力恢复的影响[J]. 西南国防医药, 2009, 19(12): 1240-1241.
- [49] 钟楚凤, 叶锋, 林建江. 咀嚼运动促进直肠癌根治术后胃肠动力的研究[J]. 中华胃肠外科杂志, 2009, 12(6): 632-633.
- [50] 陈月英, 马嫦娥, 鲁蓉, 等. 早期咀嚼口香糖促进腹部术后患者胃肠功能的恢复[J]. 解放军护理杂志, 2010, 27(8B): 1275-1276.
- [51] VASQUEZ W, HERNANDEZ A V, GARCIA-SABRIDO J L. Is gum chewing useful for ileus after elective colorectal surgery? a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials [J]. J Gastrointest Surg, 2009, 13(4): 649-656.
- [52] NJAU S. Adult sudden death caused by aspiration of chewing gum [J]. Forensic Sic Int, 2004, 139(2-3): 103-106.
- [53] THOMPSON A G, RAZAK S, HAYASINGHE R. Cardiac arrest and chewing gum, an unfortunate combination [J]. Med J Aust, 2007, 187(11): 635.

[本文编辑: 郑志惠]

· 编读往来 ·

医学类论文中数字的用法

阿拉伯数字使用规则: ①凡是可以使用阿拉伯数字而且很得体的地方, 均应使用阿拉伯数字; ②公历世纪、年代、年、月、日和时刻必须使用阿拉伯数字, 年份不能简写; ③计量单位前的数字和统计表中的数值一律使用阿拉伯数字; ④多位数的阿拉伯数字不能拆开转行。

汉字数字的用法: ①数字作为词素构成定型词、词组、惯用语、缩略语或具有修辞色彩的词句, 应使用汉字, 例如: 十二指肠等; ②邻近的两个数字并列连用表示概数时, 应使用汉字, 连用的两个数字之间不加标点, 如三四家医院等; ③不定数次一律用汉字, 例如: 任何一例患者, 无一例死亡。

参数与偏差范围的表示: ①数值范围号的使用应统一, 一般使用浪纹连接号“~”。②单位相同的参数范围, 只需写出后一个参数的单位, 例如: 35~45℃。③百分数范围: 前一个参数的百分号不能省略, 例如: 50%~60%。

[本刊编辑部]