

## 2016年《现代临床护理》继续教育试题(十)

### 一、单选题

1. 研究发现,卧床超过 1 周,机体血栓发生率明显增高;卧床超过 10 d 以上,DVT 形成发生率可达( )。  
A. 40%  
B. 50%  
C. 60%  
D. 60%
2. 在我国,糖尿病肾病是终末期肾病的第二大病因,比例为( )。  
A. 16% ~ 22.9%  
B. 17% ~ 22.9%  
C. 18% ~ 22.9%  
D. 19% ~ 22.9%
3. 脑外伤性癫痫是颅脑损伤后的严重并发症之一,尤其重型颅脑损伤发病率一般是在( )。  
A. 0.4% ~ 50%  
B. 0.5% ~ 50%  
C. 0.6% ~ 50%  
D. 0.7% ~ 50%
4. 文献报道,患者在住院期间可以得到全程、规范的护理服务,但多数患者出院后只能记住出院指导内容的( )。  
A. 59%  
B. 60%  
C. 61%  
D. 62%
5. 简体中文版事件相关反刍性沉思问卷包括( )与目的性反刍性沉思两个维度。  
A. 侵入性  
B. 反应性  
C. 高兴性  
D. 低落性

### 二、多选题

1. 陈雪霞研究报道,经口气管插管后采用固定器固定法较丝绸胶布固定法具有哪些优点( )。  
A. 固定更稳固  
B. 操作更方便  
C. 缩短护理时间  
D. 降低并发症
2. ( )是公认的 DVT 形成的 3 大要素。  
A. 静脉瘀滞  
B. 血管内膜损伤  
C. 血液高凝状态  
D. 活动减少
3. 创伤后成长评定量表包括( )及欣赏生活 5 个维度。  
A. 人际关系  
B. 新可能性  
C. 个人力量  
D. 精神改变
4. 可通过观察终末期肾病患者哪些指标( )来判断患者的容量状况。  
A. 体重  
B. 血压  
C. 尿量  
D. 出超量及水肿的表现
5. 作者翟凤仪调查发现,影响 CT 检查者候诊时间的因素包括( )。  
A. 检查流程复杂、多次排队,等候时间过长  
B. 环境布局不合理,标记不清  
C. 预约安排不合理,高峰时段扎堆检查  
D. 工作人员对设备使用或工作程序不熟悉

