

· 信 息 ·

2017 年《现代临床护理》继续教育试题 (十二)

一、单选题

1. 文献报道,因腹泻和/或粪便尿失禁引起的失禁相关性皮炎,是重症监护中常见的问题,发生率占失禁患者的()。

- A. 6%~50%
- B. 7%~50%
- C. 8%~50%
- D. 9%~50%

2. 文献报道,腹腔镜 CO₂ 皮下气肿并发症发生率为()。

- A. 2.1%~2.7%
- B. 2.2%~2.7%
- C. 2.3%~2.7%
- D. 2.4%~2.7%

3. 子宫切除及盆腔淋巴结清扫治疗宫颈癌术后,可出现淋巴囊肿或淋巴水肿,其发生率约为()。

- A. 4.3%~48.0%
- B. 4.3%~49.0%
- C. 4.3%~50.0%
- D. 4.3%~51.0%

4. 2015 年全球 3 950 万人死于慢性病,占总死亡人数的()。

- A. 68%
- B. 69%
- C. 70%
- D. 71%

5. 据研究显示,PICC 并发症发生率在()。

- A. 2%~35.3%
- B. 3%~35.3%
- C. 4%~35.3%
- D. 5%~35.3%

二、多选题

1. 尚燕春等研究发现,MICU 大便失禁患者发生 IAD 的危险因素包括()。

- A. 大便次数
- B. 年龄
- C. 体温
- D. 高血压

2. 影响慢性病患者心理一致感的相关因素包括()等。

- A. 社会人口学因素
- B. 生活质量
- C. 社会支持
- D. 应对方式

3. 赖丽君等研究报道,()与居住地为农村是新疆地区肿瘤患者化疗期间 PICC 发生并发症的危险因素。

- A. 年龄<18 岁
- B. 末端开放式 PICC
- C. 穿刺次数增多
- D. 导管维护时间>7d、

4. 综合医院住院患者自杀的影响因素包括()。

- A. 疾病
- B. 认知、人格不良
- C. 缺乏足够人际社会支持
- D. 近期生活事件

5. 综合医院住院患者自杀预防策略包括()。

- A. 关注患者生理和心理问题,减轻患者痛苦
- B. 降低医院的各类安全隐患
- C. 加强亲密接触患者人员培训
- D. 做好评估,及早识别患者自杀征象