

参考文献:

- [1] SUN L, DWYER J. Dietetics in China at the crossroads [J]. Asia Pac J Clin Nutr, 2014, 23 (1): 16–26.
- [2] 中华医学会糖尿病学分会. 中国2型糖尿病防治指南(2013年版)[J]. 中国糖尿病杂志, 2014, 22(8):2–42.
- [3] 龚清海, 应焱燕, 李辉, 等. 生活方式干预对成年空腹血糖受损患者血糖影响的系统评价及Meta分析[J]. 现代实用医学, 2015, 27(2):247–249.
- [4] 丁素英, 刘东伟, 李飞飞. 体检人群中空腹血糖受损发生水平及健康教育干预效果评价[J]. 郑州大学学报(医学版), 2017, 52(6):766–769.
- [5] 周云庆, 秦燕, 吴建平, 等. 上海市某社区家庭医生制模式对老年空腹血糖受损人群干预效果评估[J]. 上海预防医学, 2016, 28(05):341–343.
- [6] 刘毅. 媒介形态变迁与受众媒介使用[J]. 新闻大学, 2017(6):89–95.
- [7] WILD S, ROGLIC G, GREEN A, et al. Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030 [J]. Diabetes Care, 2004, 27 (5): 1047–1053.
- [8] 侯清涛, 李芸, 李舍予, 等. 全球糖尿病疾病负担现状[J]. 中国糖尿病杂志, 2016, 24(1): 92–96.
- [9] 陈如燕, 杨艳, 吴英, 等. 对空腹血糖受损体检人群实施短信回访教育的效果[J]. 解放军护理杂志, 2014, 31(21):38–40.
- [10] YANG W, LU JM, WENG JP, et al. Prevalence of diabetes among men and women in China [J]. New England Journal of Medicine, 2010, 362(12):1090–1101.
- [11] 周文龙, 黄宇虹, 张德芹. 国内外糖尿病预防临床试验研究进展[J]. 天津中医药大学学报, 2015, 34(5):314–320.
- [12] 左惠芬, 刘冬青, 商晓丽, 等. 空腹血糖受损患者胰岛素抵抗及代谢异常状况分析[J]. 现代预防医学, 2011, 38 (3):559–561.
- [13] 陆群, 谈静, 万霞, 等. 行为转变理论在空腹血糖受损人群生活方式干预中的应用[J]. 解放军护理杂志, 2014, 31(14):15–18.
- [14] 黄明君, 宋锦平, 朱红, 等. 大型三级甲等医院以微信公众号开展健康教育的现状调查研究[J]. 华西医学, 2017, 32(1):107–111.
- [15] 卢琦, 吕婕, 孟宪静, 等. 基于微信平台的健康教育对空腹血糖受损体检人群生活质量影响的研究[J]. 河北医学, 2017, 23(1):141–144.
- [16] 梁赤波, 郑坚荣, 黄得胜, 等. 糖尿病管理手机软件对社区2型糖尿病患者饮食干预的效果[J]. 解放军护理杂志, 2014, 31(10):6–10.
- [17] 袁惠萍, 张维珍, 邹丽芳, 等. 手机移动教育对PICC带管出院患者导管相关性血栓预防知信行的影响[J]. 护理学报, 2017, 24(8):61–64.

[本文编辑:郑志惠]

·编读往来·

医学类论文中数字的用法

阿拉伯数字使用规则:①凡是可以使用阿拉伯数字而且很得体的地方, 均应使用阿拉伯数字;②公历世纪、年代、年、月、日和时刻必须使用阿拉伯数字, 年份不能简写;③计量单位前的数字和统计表中的数值一律使用阿拉伯数字;④多位数的阿拉伯数字不能拆开转行。

汉字数字的用法:①数字作为词素构成定型词、词组、惯用语、缩略语或具有修辞色彩的词句, 应使用汉字, 例如:十二指肠等;②邻近的两个数字并列连用表示概数时, 应使用汉字, 连用的两个数字之间不加标点, 如三四家医院等;③不定次数一律用汉字, 例如:任何一例患者, 无一例死亡。

参数与偏差范围的表示:①数值范围号的使用应统一, 一般使用浪纹连接号“~”。②单位相同的参数范围, 只需写出后一个参数的单位, 例如:35~45℃。③百分数范围:前一个参数的百分号不能省略, 例如:50%~60%。

[本刊编辑部]